

## 维生素 E、C 颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

### 【药品名称】

通用名称：维生素 E、C 颗粒

英文名称：Vitamin E and C Granules

汉语拼音：Weishengsu E、C Keli

### 【成份】

本品为复方制剂，每袋含维生素 E100 毫克、维生素 C200 毫克。辅料为：淀粉、蔗糖、糊精、枸橼酸、桔子香精。

### 【性状】

本品为微黄色颗粒；具香味。

### 【作用类别】

本品为维生素类非处方药药品。

### 【适应症】

用于预防和治疗维生素 E 和维生素 C 缺乏引起的疾病。

### 【规格】

复方，每袋含维生素 E100 毫克、维生素 C200 毫克

### 【用法用量】

口服。成人一次 1 袋，一日 1 次。用水冲服或嚼服。

### 【不良反应】

1、长期过量服用可引起恶心、呕吐、眩晕、头痛、视力模糊、皮肤皴裂、唇炎、咽炎、腹泻、乳腺肿大以及乏力、血小板聚集及血栓形成。

2、长期大量服用可引起停药后坏血病，偶可引起尿酸盐、半胱氨酸或草酸盐结石。

### **【禁忌】**

对本品过敏者禁用。

### **【注意事项】**

- 1、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 2、本品性状发生改变时禁止使用。
- 3、请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 4、儿童必须在成人监护下使用。
- 5、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

### **【药物相互作用】**

- 1、本品与肝素或华法林联用，可引起凝血酶原时间缩短或凝血酶原血症。
- 2、巴比妥类、扑米酮、水杨酸类药物可促使维生素 C 排泄。
- 3、如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

### **【药理作用】**

维生素 C 参与体内抗体、胶原形成和组织修补以及碳水化合物、脂肪、蛋白质的代谢，保持血管完整性，增加机体的抵抗力；维生素 E 亦参与体内一些代谢反应，能对抗自由基的过氧化作用，保护皮肤及增加卵巢功能，防止习惯性流产等作用，维生素 E、维生素 C 合用可发挥抗氧化作用。

### **【贮藏】**

遮光，密封，在干燥处保存。

### **【包装】**

铝塑复合膜袋包装，10 袋/盒

**【有效期】**

暂定 24 个月

**【执行标准】**

国家药品标准 WS-10001-(HD-1284)-2002

**【批准文号】**

国药准字 H11022348

**【说明书修订日期】**

2012 年 06 月 05 日

**【生产企业】**

企业名称：华润双鹤药业股份有限公司

生产地址：北京市朝阳区双桥东路 2 号

邮政编码：100121

电话号码：( 010 ) 85399188

传真号码：( 010 ) 85390635

网 址：[www.dcp.com.cn](http://www.dcp.com.cn)

**如有问题可与生产企业联系**